



MINISTERO DELLA SALUTE

Istituto Superiore di Sanità
Centro Nazionale Sangue

Via Giano della Bella, 27
00162 Roma
Tel: 06 4990 4953 / 4954
Fax: 06 4990 4975
E-mail: cns@iss.it

I.S.S. - C.N.S.

CNS 08/03/2016-0000563



Documento Interno S1

Ai Responsabili delle Strutture regionali
di coordinamento per le attività trasfusionali
delle Regioni e Province Autonome

Alle Direzione del Servizio Trasfusionale
delle Forze Armate

Alle Associazioni e Federazioni Donatori Sangue:

AVIS
CRI
FIDAS
FRATRES

E, p.c.:

Dott. Raniero Guerra
Direttore Generale

Dott.ssa Maria Rita Tamburrini
Direttore Ufficio VIII - Sangue e Trapianti

Dott.ssa Maria Grazia Pompa
Direttore Ufficio V

Direzione Generale della Prevenzione
Ministero della Salute

Dott. Alessandro Nanni Costa
Direttore Centro Nazionale Trapianti

Dott. Giulio Pisani
Reparto Prodotti Biologici - CRIVIB
Istituto Superiore di Sanità

Dott.ssa Caterina Rizzo
Centro Nazionale Epidemiologia (CNESPS)
Istituto Superiore di Sanità

Dott.ssa Nicoletta Sacchi
Italian Bone Marrow Donor Registry (IBMDR)

Oggetto: misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da Zika virus mediante la trasfusione di emocomponenti labili.

Facendo seguito alle note già prodotte dallo scrivente Centro, in considerazione degli aggiornamenti sulle misure di prevenzione della trasmissione trasfusionale dello Zika virus forniti dalla *World Health Organization* (WHO), dalla *Pan American Health Organization* (PAHO), dall'*European Centre for Disease Prevention and Control* (ECDC) e dalla *US Food and Drug Administration* (FDA), si raccomanda di:

- fornire ai donatori adeguate informazioni comprensive della diffusione geografica dell'infezione da ZIKAV e degli strumenti per favorire il riconoscimento dei sintomi compatibili con essa, al fine di favorirne l'auto-esclusione;



Centro Nazionale Sangue

- rafforzare le misure di sorveglianza sui possibili casi importati mantenendo in essere la sorveglianza anamnestica del donatore di sangue per i viaggi nelle aree interessate;
- applicare il criterio di sospensione temporanea per 28 giorni dal rientro per i donatori che abbiano soggiornato nelle aree dove si sono registrati casi autoctoni d'infezione;
- applicare il criterio di sospensione temporanea di 28 giorni dalla risoluzione dei sintomi per i donatori con anamnesi positiva per infezione da Zika virus (infezione documentata oppure comparsa di sintomatologia compatibile con infezione da Zika virus);
- applicare il criterio di sospensione temporanea di 28 giorni dopo l'ultimo rapporto sessuale per i donatori che riferiscano un rapporto sessuale con *partner* maschile con infezione documentata o sospetta (comparsa di sintomatologia compatibile con infezione da Zika virus) oppure che abbia viaggiato o soggiornato in una zona con trasmissione attiva dello Zika virus nei 3 mesi precedenti il predetto rapporto;
- sensibilizzare ed incoraggiare i donatori di sangue ad informare il Servizio Trasfusionale di riferimento in caso di comparsa di sintomi compatibili con infezione da Zika virus oppure in caso di diagnosi d'infezione da Zika virus nei 14 giorni successivi alla donazione (*post donation information*).

Le raccomandazioni formulate nella presente nota sono suscettibili di aggiornamento in relazione all'evoluzione epidemiologica.

Ulteriori informazioni sono disponibili ai seguenti link:

<http://www.centronazionale sangue.it/notizie/sorveglianza-zika-virus-002>

<http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2016/1st-emergency-committee-zika/en/>

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11585&Itemid=41688&lang=en

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika_outbreak/Pages/zika_outbreak.aspx

<http://www.cdc.gov/zika/>

<http://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/Blood/UCM486360.pdf>

Il Direttore del Centro Nazionale Sangue
Dott. Giancarlo Maria Liumbruno